

第5章 温室効果ガス等環境調査

1 目 的

二酸化炭素等の温室効果ガスについて、環境中の濃度の測定を行い、経年変化を把握することにより、排出抑制等の地球温暖化に係る指導啓発のための基礎資料とする。

また、オゾン層を破壊する特定フロン等について、環境中の濃度の測定を行い、工場等に対する使用合理化、排出抑制等の指導啓発のための基礎資料を得る。

2 調査方法

(1) 調査地点

図5 - 1 に示す次の4地点で調査を実施しました。

豊川市・豊川市役所	(以下、「豊川市」とする。)
小牧市・小牧高校	(以下、「小牧市」とする。)
安城市・安城農林高校	(以下、「安城市」とする。)
豊川市(旧一宮町)・東三河高等技術専門学校	(以下、「旧一宮町」とする。)




図5 - 1 調査地点

(2) 調査項目

表 5 - 1 に示す 10 項目について調査を実施しました。

表 5 - 1 調査項目

調 査 地 点	調査対象 項目	二酸化炭素 亜酸化窒素	HFC-134a	CFC-11 CFC-12 CFC-113	HCFC-22 HCFC-141b	四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン
	性 質					
	温室効果ガス オゾン層破壊物質	○	○	○	○	○
豊 川 市			○	○	○	○
小 牧 市			○	○	○	○
安 城 市			○	○	○	○
旧 一 宮 町		○				

CFC-11 (707 11)、CFC-12 (707 12)、CFC-113 (707 113)

(3) 調査期間及び調査頻度

平成 20 年 4 月から平成 21 年 3 月まで

調査項目ごとの調査頻度を表 5 - 2 に示します。

表 5 - 2 調査頻度

調 査 項 目	調 査 頻 度
二酸化炭素	自動連続測定
亜酸化窒素、HFC-134a CFC-11、CFC-12、CFC-113 HCFC-22、HCFC-141b、 四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン	年 4 回

(4) 試料採取方法及び分析方法

調査項目ごとの試料採取方法及び分析方法を表 5 - 3 に示します。

表 5 - 3 試料採取方法及び分析方法

調 査 項 目	試料採取方法	分 析 方 法
二酸化炭素	非分散型赤外線ガス分析計を用いた自動連続測定装置により測定	
亜酸化窒素	テドラーバッグにより試料を採取	ガスクロマトグラフ (E C D) 装置により測定
HFC-134a	キャニスターにより試料を採取	ガスクロマトグラフ質量分析装置により測定
CFC-11、CFC-12、 CFC-113		
HCFC-22 HCFC-141b		
四塩化炭素		
1,1,1-トリクロロエタン		

3 調査結果

各調査項目の結果を表5 - 4に示します。

二酸化炭素の年平均値は401.4ppmであり、平成19年度より2.0ppm増加しました。

亜酸化窒素の年平均値は0.34ppmであり、平成19年度より0.04ppm増加しました。

HFC-134aの年平均値の県平均は0.13ppbであり、平成19年度より0.04ppb増加しました。

フロン^①の年平均値の県平均はCFC-11が0.23ppb、CFC-12が0.58ppb、CFC-113が0.07ppbであり、平成19年度と比べてCFC-11は0.04ppb減少、CFC-12は0.03ppb減少し、CFC-113は平成19年度と同じでした。

HCFC-22及びHCFC-141bの年平均値の県平均はそれぞれ0.28ppb、0.06ppbであり、平成19年度と比べHCFC-22は0.01ppb減少、HCFC-141bは0.02ppb増加しました。

四塩化炭素の年平均値の県平均は0.10ppbであり、平成19年度と同じでした。

1,1,1-トリクロロエタンの年平均値の県平均は0.01ppbであり、平成19年度と同じでした。

表5 - 4 温室効果ガス等の調査結果 - (1)

調査地点	二酸化炭素(ppm)	亜酸化窒素(ppm)				
	年平均値	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
旧一宮町	401.4	0.34	0.32	0.36	0.34	0.35
(名古屋市天白区) ¹	410					
(名古屋市中区) ¹	415					
(岩手県大船渡市) ²	388.5	0.32				

1 「平成20年度二酸化炭素濃度年報」(名古屋市)

2 「気候変動監視レポート2008」(気象庁)

調査地点	HFC-134a (ppb)				
	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
豊川市	0.12	0.18	0.08	0.09	0.13
小牧市	0.14	0.22	0.11	0.11	0.10
安城市	0.12	0.16	0.11	0.13	0.09
県平均	0.13				
(川崎市) ³	0.11				
(北海道) ³	0.056				

3 川崎市のデータは、2008年3月～2009年2月の中央値。

北海道のデータは20年度(2008年8月、2009年1月)の平均値

「平成20年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」(環境省)

表 5 - 4 温室効果ガス等の調査結果 - (2)

調査地点	CFC-11 (ppb)					CFC-12 (ppb)				
	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
豊川市	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24	0.59	0.76	0.53	0.49	0.57
小牧市	0.23	0.22	0.25	0.23	0.23	0.58	0.75	0.54	0.48	0.56
安城市	0.23	0.22	0.25	0.23	0.22	0.57	0.73	0.53	0.48	0.54
県 平 均	0.23					0.58				
(川崎市) ⁴	0.27					0.56				
(北海道) ⁴	0.24					0.54				

調査地点	CFC-113 (ppb)				
	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
豊川市	0.08	0.05	0.08	0.09	0.10
小牧市	0.07	0.05	0.08	0.08	0.08
安城市	0.07	0.05	0.08	0.07	0.07
県 平 均	0.07				
(北海道) ⁴	0.08				

調査地点	HCFC-22 (ppb)					HCFC-141b (ppb)				
	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
豊川市	0.27	0.26	0.30	0.25	0.27	0.04	0.01	0.03	0.04	0.06
小牧市	0.30	0.30	0.36	0.29	0.27	0.12	0.02	0.04	0.35	0.05
安城市	0.28	0.24	0.28	0.33	0.25	0.03	0.01	0.04	0.04	0.03
県 平 均	0.28					0.06				
(川崎市) ⁴	0.49					0.06				
(北海道) ⁴	0.20					0.02				

調査地点	四塩化炭素 (ppb)					1,1,1-トリクロロエタン (ppb)				
	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
豊川市	0.10	0.08	0.11	0.10	0.11	0.02 ⁵	<0.016	0.01	0.02	0.03
小牧市	0.10	0.08	0.11	0.10	0.09	0.01 ⁵	<0.016	0.01	0.01	0.01
安城市	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.01 ⁵	<0.016	0.01	0.01	0.01
県 平 均	0.10					0.01				
(北海道) ⁴	0.09					0.01				

4 川崎市のデータは、2008 年 3 月～2009 年 2 月の中央値。

北海道のデータは 20 年度（2008 年 8 月、2009 年 1 月）の平均値。

「平成 20 年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」（環境省）

5 調査結果が検出下限値未満の場合、平均値の算出は検出下限値の 1 / 2 の値を代入し求めた。

平成 20 年度の二酸化炭素の月間値を表 5 - 5 に、月平均値の推移を図 5 - 2 に示す。また、調査項目ごとの年平均値の経年変化を表 5 - 6 及び図 5 - 3 に示します。

表 5 - 5 二酸化炭素の月間値

区 分		測 定 日 数	測定時間	月平均値	1 時間値の 最 小 値	1 時間値の 最 大 値
年 月		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
平成 20 年	4	26	608	399	381	447
	5	31	730	404	376	452
	6	28	656	406	369	472
	7	15	348	406	368	474
	8	13	261	403	362	467
	9	23	518	408	370	475
	10	28	666	407	374	473
	11	25	585	396	378	435
	12	31	744	396	380	434
平成 21 年	1	31	744	398	380	434
	2	28	672	398	385	433
	3	23	515	396	386	425
通 年		302	7,047	401	362	475




図 5 - 2 二酸化炭素の月平均値の推移

表 5 - 6 二酸化炭素等の年平均値の経年変化

項 目 \ 年 度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
二酸化炭素 (ppm)	386	390	385	385	390	389	395	397	399	401
亜酸化窒素 (ppm)	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.31	0.30	0.34
HFC-134a (ppb)	0.10	0.20	0.15	0.09	0.14	0.12	0.12	0.12	0.09	0.13
CFC-11 (ppb)	0.28	0.25	0.26	0.27	0.26	0.27	0.25	0.25	0.27	0.23
CFC-12 (ppb)	0.61	0.54	0.56	0.60	0.61	0.55	0.54	0.54	0.61	0.58
CFC-113 (ppb)	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07
HCFC-22 (ppb)	0.38	0.65	0.42	0.27	0.34	0.33	0.44	0.32	0.29	0.28
HCFC-141b (ppb)	0.14	0.21	0.15	0.06	0.10	0.13	0.05	0.05	0.04	0.06
四塩化炭素 (ppb)	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10
1,1,1-トリクロロエタン (ppb)	0.08	0.07	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01






図 5 - 3 二酸化炭素等の年平均値の経年変化 - (1)






図5 - 3 二酸化炭素等の年平均値の経年変化 - (2)